



Danske
Regioner

Patientkort

- *Vis kortet til læge eller sygeplejerske ved kontakt til sundhedsvæsenet angående tegn på infektion eller slimhindeinflammation*

B-celle-depleterende behandling

Patienten er i behandling med et lægemiddel, der depleterer kroppens B celler.

Navn:

Præparat:

Afdeling:

Hospital:



Danske
Regioner

Infektionsrisiko

Behandlingen kan være forbundet med:




- Øget risiko for bakterielle, virale og svampe infektioner.
- Alvorlige infektioner ses hyppigere ved langvarig behandling, høj alder og lav immunglobulin G .
- Neutropeni (late onset)



Danske
Regioner

Infektionsrisiko (fortsat)

- Atypiske infektioner:
 - Neoehrlichiose (feber, nattesved, væggtab, træthed, hududslæt, artrit eller trombose).
 - Borrelia (ofte atypisk præsentation med tegn på systemisk infektion).
 - Langvarig COVID-, parvovirus -eller enterovirusinfektion.
 - Sekundær organiserende pneumoni.
 - Pneumocystis-pneumoni.

<p style="text-align: center;">Infektioner - behandling</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Almindelige infektioner (øvre luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner etc.) behandles efter gældende retningslinjer. • Late onset neutropeni: Drøft med hæmatolog om behandling med granulocyt-kolonistimulerende faktor er indiceret. • Flere af de atypiske infektioner kræver særlige behandlinger: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Neoehrlichiose: Doxycyklin. ▪ Langvarig COVID: Overvej remdisivir eller nirmatrevir/ritonavir/il. ▪ Parvo- og enterovirus: Overvej IVIG ▪ Sekundær organiserende pneumoni: Antibiotika, antiviral 	<p style="text-align: center;">Infektioner - diagnostik</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Tag altid infektionstal inkl. differential tælling ved uforklaret feber eller høj feber >3 dage. • Antistof-baserede tests for infektioner (f.eks. borrelia, syfilis, parvovirus, hepatitis) kan være falsk negative. Alternativ diagnostik (PCR) bør overvejes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Borrelia og syfilis: PCR. ▪ Enterovirus, parvovirus m.fl.: PCR. • Neoehrlichiose: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der ses CRP-forhøjelse, anæmi eller trombocytopeni. 	<p style="text-align: center;">Slimhindeinflammation</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Der er beskrevet colitis, gastritis, vaginitis, cystitis og konjunktivitis i relation til B-celle-depletterende behandling. • Slimhindeinflammation kræver udredning for andre årsager. • Hvis der ikke findes andre årsager, bør sammenhæng med behandlingen og behandlingsstop overvejes.
--	---	---

--	--	--