



Danske
Regioner

Patientkort

- *Vis kortet til læge eller sygeplejerske ved kontakt til sundhedsvæsenet angående tegn på infektion eller slimhindeinflammation*

B-celle-depleterende behandling

Patienten er i behandling med et lægemiddel, der depleterer kroppens B celler.

Navn:

Præparat:

Afdeling:

Hospital:



Danske
Regioner

Infektionsrisiko

Behandlingen kan være forbundet med:

- Øget risiko for bakterielle, virale og svampe infektioner.
- Alvorlige infektioner ses hyppigere ved langvarig behandling, høj alder og lav immunglobulin G .
- Neutropeni (late onset)



Danske
Regioner

Infektionsrisiko (fortsat)

- Atypiske infektioner:
 - Neoehrlichiose (feber, nattesved, væggtab, træthed, hududslæt, artrit eller trombose).
 - Borrelia (ofte atypisk præsentation med tegn på systemisk infektion).
 - Langvarig COVID-, parvovirus -eller enterovirusinfektion.
 - Sekundær organiserende pneumoni.
 - Pneumocystis-pneumoni.



Danske
Regioner

Slimhindeinflammation

- Der er beskrevet colitis, gastritis, vaginitis, cystitis og konjunktivitis i relation til B-celle-depleterende behandling.
- Slimhindeinflammation kræver udredning for andre årsager.
- Hvis der ikke findes andre årsager, bør sammenhæng med behandlingen og behandlingsstop overvejes.



Danske
Regioner

Infektioner - diagnostik

- Tag altid infektionstal inkl. differential tælling ved uforklaret feber eller høj feber >3 dage.
- Antistof-baserede tests for infektioner (f.eks. borrelia, syfilis, parvovirus, hepatitis) kan være falsk negative. Alternativ diagnostik (PCR) bør overvejes:
 - Borrelia og syfilis: PCR.
 - Enterovirus, parvovirus m.fl.: PCR.
- Neoehrlichiose:
 - Neoehrlichiose: PCR i blod (SSI).
 - Der ses CRP-forhøjelse, anæmi eller trombocytopeni.



Danske
Regioner

Infektioner - behandling

- Almindelige infektioner (øvre luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner etc.) behandles efter gældende retningslinjer.
- Late onset neutropeni: Drøft med hæmatolog om behandling med granulocyt-kolonistimulerende faktor er indiceret.
- Flere af de atypiske infektioner kræver særlige behandlinger:
 - Neoehrlichiose: Doxycyklin.
 - Langvarig COVID: Overvej remdisivir eller nirmatrelvir/ritonavirvil.
 - Parvo- og enterovirus: Overvej IVIG
 - Sekundær organiserende pneumoni: Antibiotika, antiviral

